

MIZOX PROPIEDADES

Mizox contiene Ketoconazol agente antimicótico de amplio espectro, del grupo de los azoles, derivado sintético del imidazol, con acción fungistática y fungicida, dependiendo de la dosis.

El Ketoconazol inhibe la síntesis del ergosterol lo que altera la membrana del miceto, provocándole una mayor permeabilidad, por lo que hay una pérdida de los componentes celulares, esto produce una acción fungistática. En mayor concentración puede tener una acción fisicoquímica sistémica directa sobre la membrana celular del miceto ejerciendo una acción fungicida. La absorción sistémica del Ketoconazol, tras la aplicación tópica o vaginal es mínima.

INDICACIONES:

MIZOX (Óvulo Vaginal): Está indicado en el tratamiento local de candidiasis vulvovaginal aguda y crónica.

MIZOX(Crema dérmica): Está indicada en el tratamiento tópico de infecciones cutáneas por candidiasis o por dermatofitos y en la pitiriasis versicolor. Dermatitis seborréica, Tiña del cuerpo, Tiña de la mano, tiña de pie, tiña crural, Micosis en membranas mucosas debido a: Trichophyton sp, Microsporum sp y Epidermophyton sp.

MIZOX(Solución tópica): Indicado en deremartomicosis , tiña de pies, manos, uñas.

Mizox(Jabón) Indicado como coayudante en candidiasis cutánea, dermatitis seborreica, tiña del cuerpo, manos, ect.

MIZOX(Shampoo): Indicado en el tratamiento y profilaxis de infecciones causadas por Pityrosporum ovale, como pitiriasis capitis (caspa) pitiriasis versicolor (localizada) y dermatitis seborreica.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al Ketoconazol.

ÓVULO VAGINAL: En la candidiasis vulvovaginal aguda o crónica aplique un óvulo de manera profunda, preferiblemente al acostarse, durante cinco días consecutivos. En caso de infección crónica recidivante, el tratamiento puede ser utilizado intermitentemente, por varios meses.

JABÓN PASTA: En todos los casos, humedezca la zona afectada y alrededores, con agua y lávese una o dos veces al día con el jabón en pasta, hasta producir espuma, luego deje reposar por unos minutos y enjuague bien. Repita la aplicación y finalmente deje el cuerpo o área lavada secar al aire. Luego aplíquese la crema o solución.

CREMA DÉRMICA: Aplique la crema una o dos veces al día, en cantidad suficiente, para cubrir el área afectada y alrededor de la misma, por dos o tres semanas. En tiña crural, del pelo, cuero, pies, manos y uñas, el tratamiento será dependiendo de la severidad

de la infección y de la respuesta del paciente entre dos y seis semanas. El tratamiento debe continuarse, aún desaparecidos los síntomas, unos cuantos días más.

SOLUCIÓN TÓPICA: En la dermatomicosis, tiña de pies, manos, uñas, aplique la solución una o dos veces al día, en cantidad suficiente para cubrir el área afectada y alrededor de la misma. El tratamiento será dependiendo de la severidad de la infección y de la respuesta del paciente entre 2 y 6 semanas. El tratamiento debe continuarse, una vez desaparecidos los síntomas, unos cuantos días más.

SHAMPOO: Aplique en las zonas afectadas de la piel o del pelo y deje reposar por unos 3 a 5 minutos antes de enjuagar. En la pitiriasis versicolor lave una vez al día, por 5 días consecutivos y como profilaxis lave 1 vez al día, por 3 días consecutivos, como tratamiento simple. En la dermatitis seborreica y la pitiriasis capitis, lave 2 veces a la semana, durante 4 semanas y como profilaxis lave una vez a la semana, por 2 semanas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Los más frecuentes son irritación, dermatitis o sensación de quemazón.

ADVERTENCIAS

ÚSESE POR INDICACIÓN MÉDICA FACULTATIVA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAMIENTO:

Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura de 15 a 30 grados Celsius. Protéjase de la luz solar y la humedad.

PRESENTACIÓN:

MIZOX (Óvulo vaginal): Caja conteniendo 5 óvulos vaginales.

MIZOX(Jabón pasta): Caja con un jabón pasta de 100g.

MIZOX(Crema dérmica): Caja conteniendo un tubo de 25g.

MIZOX(Solución Tópica): Caja conteniendo frasco gotero de 30mL.

MIZOX(Shampoo): Caja conteniendo frasco de 100mL.